

# Paracetamol B. Braun 10 mg/ml

Infusionslösung

Generika B. Braun

Körpergewicht	<input type="text"/>
Einzeldosis als 15-minütige intravenöse Infusion	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Maximale Tagesdosis**	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Einzusetzende Flaschengröße	<input type="text"/>
	<input type="text"/>



Insbesondere bei Kindern und bei Patienten mit einem Körpergewicht unter 50 kg besteht das Risiko einer Überdosierung mit der Infusionslösung Paracetamol B. Braun 10 mg/ml, wenn die Dosierungsvorschriften nicht eingehalten werden.

Die zu verabreichende Dosis hängt bei Patienten unter 50 kg ausschließlich von deren Körpergewicht ab. Abhängig vom Gewicht des Kindes kann das benötigte Volumen sehr niedrig sein. Um insbesondere bei Neugeborenen und Säuglingen Dosierungsfehler durch Verwechslung von Milligramm (mg) und Milliliter (ml) zu vermeiden, empfehlen wir, das zu verabreichende Volumen in Milliliter (ml) anzugeben.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | www.generika.bbraun.de

\*\*Gilt nur für Patienten, die keine anderen Paracetamol-haltigen Arzneimittel erhalten.

⚠ Bei Patienten mit Risikofaktoren für Lebertoxizität beträgt die maximale Tagesdosis Paracetamol 3000 mg bzw. 300 ml.

ST.03.10.15/1 Nr. 3961119 Stand: 10/2015

# Paracetamol B. Braun 10 mg/ml

Infusionslösung

Generika B. Braun

Für Patienten von 10 kg bis 33 kg



	Für reife Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder bis 10 kg*	Für Kleinkinder und Kinder über 10 kg und bis 33 kg	Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder über 33 kg und bis 50 kg	Für Erwachsene und Jugendliche über 50 kg ohne zusätzliche Risikofaktoren für Lebertoxizität	Für Erwachsene und Jugendliche über 50 kg mit Risikofaktoren für Lebertoxizität
<b>Einzeldosis</b> als 15-minütige intravenöse Infusion	7,5 mg/kg (d. h. 0,75 ml Lösung/kg) bis zu 4-mal täglich	15 mg/kg (d. h. 1,5 ml Lösung/kg) bis zu 4-mal täglich	15 mg/kg (d. h. 1,5 ml Lösung/kg) bis zu 4-mal täglich	1000 mg (d. h. 1 Flasche) bis zu 4-mal täglich	1000 mg (d. h. 1 Flasche) bis zu 3-mal täglich
<b>Maximales Volumen</b> von Paracetamol B. Braun 10 mg/ml pro Einzeldosis basierend auf dem Höchstgewicht der jeweiligen Gewichtsklasse***	7,5 ml	49,5 ml	75 ml	100 ml	100 ml
<b>Mindestzeitabstand</b>	Mindestzeitabstand zwischen den Einzeldosen: 4 Stunden bzw. 6 Stunden bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz				
<b>Maximale Tagesdosis**</b>	30 mg/kg (d. h. 3 ml Lösung/kg) nicht mehr als 300 mg (d. h. 3 Ampullen)	60 mg/kg (d. h. 6 ml Lösung/kg) nicht mehr als 2000 mg (d. h. 4 Flaschen)	60 mg/kg (d. h. 6 ml Lösung/kg) nicht mehr als 3000 mg (d. h. 3 Flaschen)	4000 mg (d. h. 4 Flaschen)	3000 mg (d. h. 3 Flaschen)
<b>Einzusetzende Darreichung</b>	10 ml Mini-Plasco®: 1 ml = 10 mg für Patienten bis 10 kg	50 ml Ecoflac® plus: 1 ml = 10 mg f. Patienten von 10–33 kg	100 ml Ecoflac® plus: 1 ml = 10 mg für Patienten über 33 kg		

Für Patienten über 33 kg



Für Patienten bis 10 kg

\*Es liegen keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei Frühgeborenen vor. \*\*Gilt nur für Patienten, die keine anderen Paracetamol-haltigen Arzneimittel erhalten. \*\*\*Bei Patienten mit geringerem Körpergewicht müssen entsprechend kleinere Volumina verabreicht werden. Der Dosisschieber gilt nur für die Anwendung einer unverdünnten Paracetamol B. Braun Infusionslösung. Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Fachinformation.

Bitte beachten Sie den Pflichttext auf der Innenseite.

Körpergewicht		2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	> 50 kg
	Einzeldosis als 15-minütige intravenöse Infusion	15 mg	23 mg	30 mg	38 mg	45 mg	53 mg	60 mg	68 mg	75 mg	225 mg	300 mg	375 mg	450 mg	525 mg	600 mg	675 mg	750 mg	1000 mg
		1,5 ml	2,3 ml	3,0 ml	3,8 ml	4,5 ml	5,3 ml	6,0 ml	6,8 ml	7,5 ml	22,5 ml	30,0 ml	37,5 ml	45,0 ml	52,5 ml	60,0 ml	67,5 ml	75,0 ml	100,0 ml
	Maximale Tagesdosis**	60 mg	90 mg	120 mg	150 mg	180 mg	210 mg	240 mg	270 mg	300 mg	900 mg	1200 mg	1500 mg	1800 mg	2100 mg	2400 mg	2700 mg	3000 mg	4000 mg
		6 ml	9 ml	12 ml	15 ml	18 ml	21 ml	24 ml	27 ml	30 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	210 ml	240 ml	270 ml	300 ml	400 ml
	Einzusetzende Darreichung	10 ml	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml								

 Bei Patienten mit Risikofaktoren für Lebertoxizität beträgt die maximale Tagesdosis Paracetamol 3000 mg bzw. 300 ml.

**Paracetamol B. Braun 10 mg/ml****Infusionslösung***Zusammensetzung*

Ein ml Infusionslösung enthält 10 mg Paracetamol.

Jede 10 ml Ampulle enthält 100 mg Paracetamol.

Jede 50 ml Flasche enthält 500 mg Paracetamol.

Jede 100 ml Flasche enthält 1000 mg Paracetamol.

**Anwendungsgebiete**

Paracetamol B. Braun wird angewendet zur Kurzzeitbehandlung mäßig starker Schmerzen, insbesondere nach Operationen und Kurzzeitbehandlung von Fieber, wenn die intravenöse Anwendung aufgrund einer dringend erforderlichen Behandlung von Schmerzen oder Fieber klinisch gerechtfertigt ist und/oder wenn andere Arten der Anwendung nicht möglich sind.

**Gegenanzeigen**

Überempfindlichkeit gegen Paracetamol, Propacetamolhydrochlorid (Prodrug von Paracetamol) oder einen der sonstigen Bestandteile; Fälle schwerer hepatozellulärer Insuffizienz.

**Nebenwirkungen**

In klinischen Studien wurden häufige Nebenwirkungen an der Injektionsstelle angegeben (Schmerzen und Brennen). Thrombozytopenie, Leukopenie, Neutropenie; Überempfindlichkeitsreaktion (sehr selten wurden Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen angegeben, die von einem einfachen Hautausschlag oder einer Urtikaria bis hin zu einem anaphylaktischen Schock reichten. In diesen Fällen muss die Behandlung abgesetzt werden); Tachykardie; Hypotonie, Flush; erhöhte Spiegel der Lebertransaminasen; Pruritus, Erythem; Unwohlsein.

*Stand der Information 06/2015; Verschreibungspflichtig*

**Pharmazeutischer Unternehmer**

B. Braun Melsungen AG, D-34209 Melsungen